

**Verdenking UWI  
bij de kwetsbare oudere met  
verblijfskatheter**

Ja

**Heeft patiënt ÉÉN OF MEER van de volgende  
symptomen?**

- Koorts\*  $\geq 24$  uur
- Koude rillingen
- Duidelijk delier\*\*, na uitsluiten  
urineretentie als oorzaak

EN

**IS ER GEEN SPRAKE VAN EEN ANDER  
INFECTIEFOCUS?**

Ja

**SCHRIJF ANTIBIOTICA VOOR**  
na het verwijderen van de katheter en  
het afnemen van een urinekweek.

Wanneer het verwijderen van een  
katheter niet mogelijk is, vervang de  
katheter en neem een urinekweek af  
nadat de nieuwe katheter geplaatst is.

Evalueer empirische antibioticakeuze  
aan de hand van de uitslag van de  
urinekweek

Nee

**GEEN ANTIBIOTICA VOOR  
URINEWEGINFECTIE**

- Overweeg andere oorzaak voor  
de klachten
- Blijf patiënt actief monitoren\*\*\*
- Heroverweeg als nieuwe  
klachten ontstaan of als  
bestaande klachten niet  
verdwijnen

\* Koorts: eenmalige tympane temperatuur  $> 37.8$  of eenmalige rectale temperatuur  $> 38.1$  of herhaalde tympane temperatuur  $> 37.2$  of herhaalde rectale temperatuur  $> 37.5$ . NB: in geval van twijfel verdient rectale temperatuurmeting steeds de voorkeur. \*\* Delier: definitie volgens DSM-5. \*\*\* Actief monitoren: monitoren van vitale functies, aandacht voor vochthuishouding en herhaaldelijk lichamelijk onderzoek.

DISCLAIMER: DEZE BESLISBOOM IS MET GROTE ZORGVULDIGHEID ONTWIKKELD. DE ADVIEZEN DIE VOLGEN UIT DE BESLISBOOM ZIJN CONFORM OP DE ADVIEZEN UIT DE RICHTLIJN 'URINEWEGINFECTIES BIJ KWETSBARE OUDEREN' VAN VERENSO (2018). DEZE BESLISBOOM KAN INGEZET WORDEN ALS HULPMIDDEL. U BLIJFT ALS ARTS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET NEMEN VAN EEN BEHANDELBSLISSING.