

Stroomschema (behandel)advies voor SO's en AVG's in de langdurige zorg

versie 23-04-2020

1. Algemene maatregelen

Organisatorisch

- alleen noodzakelijke (para)medische zorg
- zorg op afstand waar mogelijk
- werken in cohorten + wisseldiensten
- minimale verplaatsing van behandelaren
- geen fysieke bijeenkomsten

Hygiëne

- handhygiëne
- hoest/nieshygiëne
- Extra aandacht persoonlijke hygiëne (hand/polssieraden, kleding)

Geen bezoek (VVT)/ beperkt bezoek (VG), behalve in de stervensfase

2. Testen patiënt

Verdenking Covid-19 (casusdefinitie: zie achterkant)

SO/AVG beslist wel/niet testen

Neem testmateriaal af na 24u klachten en vraag diagnostiek aan

Bevestigd geval

Meld bevestigde gevallen bij de GGD en informeer contacten (brief)

4. Behandelen

Supportive care (bijv. richtlijn LLWI)

Palliatieve zorg

5. Overlijden

Zie website RIVM

Meld het overlijden bij de GGD

3. Maatregelen bij (mogelijke) COVID-19

Beschermingsmiddelen medewerker (filmpjes):



chirurgisch/FFP1 of bij vrijkomen aerosolen FFP2

Hergebruik/verlengd gebruik waar mogelijk

Isolatie (1-pers. kamer met sanitair of alternatief)

Opheffen bij negatieve test (verdenking) of 72u klachtenvrij (bevestigd geval)

Als dat niet meer kan

Cohortering

Alleen zieken → opheffen na laatste patiënt 72u klachtenvrij

Zieken + niet-zieken

Laatste patiënt 24u klachtenvrij

Quarantaineperiode

14dgn



Onbeschermd contact met patiënten → contactonderzoek

Medewerkers met hoest/koorts: volg advies RIVM

continueren

Samenvatting (behandel)advies voor SO's en AVG's in de langdurige zorg

Algemeen

- Formeer een uitbraakteam, wijs 1 SO aan als coördinator, handel snel, anticipeer op de toekomst en wijk indien nodig af van dit advies
- Zet in op preventie, screening en isolatie/cohortering en kies verantwoord of een patiënt naar het ziekenhuis moet
- Registreer bevestigde/mogelijke gevallen
- Wees alert op het vastleggen van afspraken over ACP in het dossier
- Verwijs naar de site/informatielijn van het RIVM

1. Algemene maatregelen

- Basis hygiënemaatregelen voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers: extra aandacht persoonlijke hygiëne (hand/polssieraden, kleding), handhygiëne, hoest/nieshygiëne
- Organisatorisch: alleen noodzakelijke (para)medische zorg, zorg op afstand waar mogelijk, minimale verplaatsing van behandelaren, wisseldiensten, werken in cohorten, geen fysieke bijeenkomsten
- [Geen bezoek](#) (VVT)/beperkt bezoek (VG), behalve in de [stervensfase](#) (hand- en nies/hoesthygiëne, 1,5m afstand en beschermingsmiddelen of kleding wassen)

2. Testen patiënt

- SO/AVG beslist wie getest wordt.
- Casusdefinitie verdachte patiënt: ≥ 2 van de symptomen:
 - koorts/koortsachtig gevoel
 - hoesten
 - kortademigheid

of verdenking op basis van klinische blik arts

- Neem testmateriaal af na 24 klachten ([instructie](#)) en vraag diagnostiek aan. Testsets zijn te regelen via de GGD of het eigen lab. [Lijst van laboratoria die een SARS-CoV-2 test aanbieden.](#)
- Casusdefinitie bevestigd geval: Elke persoon waarbij door middel van RT-PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met SARS-CoV-2 is vastgesteld.
- Meld bevestigde gevallen bij de GGD en informeer contacten ([richtlijn, rechts kopje leefregels en informatiebrieven](#)).

3. Maatregelen bij (mogelijke) COVID-19

- Isolatie: op 1-persoonskamers met sanitair of zoek naar alternatieven. Badkamer delen kan in volgorde niet-zieke, zieke, reinigen/desinfecteren.
- Opheffen: bij negatieve test of 72 uur klachtenvrij.

Als dat niet meer kan:

- Cohortering: in overleg met deskundige infectiepreventie.
- Beschermingsmiddelen medewerker ([Filmpjes](#)):
 - Schort
 - Masker (chirurgisch/FFP1 of bij vrijkomen aerosolen FFP2)
 - Handschoenen
 - Spatbril.

Hergebruik/verlengd gebruik waar mogelijk, kleeft om buiten isolatiekamer en reinig/desinfecteer isolatiekamer dagelijks.

- Medewerkers met hoest/verkoudheid/koorts: [volg advies RIVM](#)
- Quarantaineperiode 14 dgn:
 - Laatste patiënt 24u klachtenvrij in zieken/niet-ziekencohort
 - Patiënten in contact met verdachte patiënt/medewerker

4. Behandelen

- Er is geen bewezen behandeling, alleen supportieve care zoals zuurstofvoorziening of behandeling van luchtweginfecties volgens de [richtlijn LLWI](#).
- Zorgverlening in de palliatieve fase: [palliaweb](#)

5. Overlijden

- [Zie website RIVM](#)
- Meld het overlijden van een bevestigde COVID-19 patiënt bij de GGD