

**Tabel 1. Patiëntkenmerken bij de acht Nederlandse onderzoeken over psychofarmacagebruik in de periode 2003- 2011**

Patiënt Kenmerken	Waalbed-1	Waalbed-2	VURAI	MWD1	MWD2	STA-OP	DCM	RightTime PlaceCare	GRIP
Type onderzoek	Dwarsdoor snede	Cohort	Dwarsdoor snede	Dwarsdoor snede	Dwarsdoor snede	RCT	RCT	Dwarsdoor snede	RCT
Midden periode (baseline) dataverzameling	Sep 03	Nov 06	Jan 08	Jan 09	Jan 11	Jan-11	Feb 11	Mei 11	Aug 11
N	1319	290	1090	1327	1145	288	119	113	393
Leeftijd (gem, SD)	83 (8)	84 (7)	>50% 85+	84	84	84 (7)	83 (6)	84 (6)	84 (7)
% vrouw	80	78	75	77	76	72	74	74	70
Stadium dementie			1)						
GDS 3, 4 (%)	3	6				0	16		7
GDS 5 (%)	18	23				12	18		28
GDS 6 (%)	51	42				60	34		55
GDS 7 (%)	28	28				28	28		10
MMSE (gem, SD)[scorebereik 0-30]		7						11 (6)	
NPI-NH totaal score (gem, SD)[score bereik 0-144]	22 (18)	17 (15)	2)			16 (15)	14 (14)		23 (20)
NPI-Q totaal score (gem, SD) [score bereik 0-36]				11	12			7 (6)	
CMAI totaal score (gem, SD)[score bereik 29-203]	48 (16)	44 (14)				47 (18)	45 (15)		51 (18)

Afkortingen: GDS = Global Deterioration Scale, MMSE = Mini-Mental State Examination, NPI = neuropsychiatric Inventory (Nursing home – NH of Questionnaire –Q), CMAI = Cohen-Mansfield Agitation Inventory. Voor de afkortingen van de studies wordt verwezen naar de tekst. 1) 48% van de patiënten had een ernstige cognitieve beperking, 2) 59% van de patiënten had een of meerdere gedragsproblemen, gemeten met de Minimum dataset (MDS) van het Resident Assessment Instrument (RAI).